Amiinide füüsikalised omadused

Amiin $C_nH_{2n+1}NH_2$	n	Kt, ^oC 1 atm	St, ^oC
CH_3NH_2	1	-6,5	-92
$CH_3CH_2\ NH_2$	2	10,6	-81
$CH_3CH_2CH_2\ NH_2$	3	49	-83
$CH_3CH(NH_2)CH_3$	3	34	-
$CH_3CH_2CH_2CH_2\ NH_2$	4	78	?49
$CH_3CH(NH_2)CH_2CH_3$	4	56	?49,8
$CH_3CH_2CH_2\ CH_2CH_2\ NH_2$	5	102	-55
$CH_3CH(NH_2)CH_2\ CH_2CH_3$	5	83	-

Diamiin $C_nH_{2n}(NH_2)_2$	n	Kt, ^oC 1 atm	St, ^oC
$NH_2CH_2CH_2\ NH_2$	2	116	9
$NH_2CH_2CH_2CH_2\ NH_2$	3	140	?12

Õppematerjalid on valminud Eesti Teadusagentuuri programm TeaMe raames ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist. TeaMe on teadust ja tehnoloogiat populariseeriv programm, mille üheks eesmärgiks on uute loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna õppematerjalide väljatöötamine üldhariduskoolile. Lisainfo: www.etag.ee/teame

Eesti Teadusagentuur
Estonian Research Council

TeaMe

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti tuleviku heaks

